复方铝酸铋颗粒治疗急性糜烂出血性胃炎的效果观察

杨富兰

摘要：目的：探讨分析对急性糜烂出血性胃炎患者采用复方铝酸秘颗粒进行治疗的临床应用效果。方法：选取本院收治的52例患者进行此次研究，按照优质护理实行前后顺序对患者进行分组，其中在2018年01月之前接受常规硫糖铝片进行治疗的26例患者作为参照组，在2018年01月-2019年01月期间接受联合复方铝酸秘颗粒治疗的26例患者作为试验组。对比两者的临床治疗效果、不良反应率以及疾病复发率。结果：试验组患者的治疗效果明显比参照组患者效果好，组间对有明显差异，（$P<0.05$）；试验组患者的疾病复发率以及不良反应率均明显比参照组患者低，组间对比有明显差异（$P<0.05$）。结论：本次临床研究的结果表明，对急性糜烂出血性胃炎患者用复方铝酸秘颗粒治疗能够取得更好的效果，还可以有效的避免患者停药后再次发病，减少患者的不良反应，是一种值得推广的治疗手段。

关键词：性糜烂出血性胃炎；复方铝酸铋颗粒；治疗效果

随着我国社会经济的快速发展，我国人民的日常生活节奏也有了明显的加快，生活、饮食不规律的人群也是大幅上升，这就使的急性糜烂出血性胃炎的发病率在近些年来在我国呈现出不断增长的趋势，这种疾病也是造成上消化道出血的主要原因，一旦患者发病，将会极大的威胁患者的生命安全[1]。因此，本次临床研究旨在探讨分析对急性糜烂出血性胃炎患者采用复方铝酸秘颗粒进行治疗的临床效果。详述如下文。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院收治的52例患者进行此次研究，按照优质护理实行前后顺序对患者进行分组，其中在2018年01月之前接受常规硫糖铝片进行治疗的26例患者作为参照组，在2018年01月-2019年01月期间接受联合复方铝酸秘颗粒治疗的26例患者作为试验组。所有患者中，男性30例，女性22例，年龄区间为20岁到71岁，平均年龄为38.1（s=5.3）岁。两组患者的基线资料不具备统计学意义（$P>0.05$），具有可比性。

1.2 方法

参照组患者采用硫糖铝片治疗，每天用药三次，每次1.0g；试验组患者则接受复方铝酸秘颗粒治疗，每天用药三次，每次1.3g。

1.3 观察指标

对两组患者在治疗期间的不良反应情况和治疗效果、治疗后的疾病复发情况进行观察并记录。患者的治疗效果分为显效、有效和无效，治疗总有效率=（显效+有效）/例数×100。显效：患者在临床上的主要症状表现完全消失，胃镜检查显示患者的胃粘膜已经完全恢复；有效：患者在临床上的主要症状有明显缓解，胃镜检查显示患者的胃粘膜出血和糜烂的情况都有明显的好转；无效：患者在临床上的主要症状美有明显缓解，胃镜检查显示患者的胃粘膜出血和糜烂的情况没有改善甚至是恶化。

1.4 统计学分析

采用SPSS22.0统计学软件对本次研究的结果进行分析，计数的资料数据都采用卡方检验，，并采用百分比（%）表示；行t检验，通过均数±标准差表示计量资料，行t检验。当检验的结果显示$P<0.05$，表明本次研究中数据资料的对比有明显差异。

2 结果

2.1 对比两组患者的临床治疗效果

试验组患者的治疗效果，显效、有效、无效分别为：10例、13例、3例，总有效率为88.46%；参照组患者的治疗显效、有效、无效分别为：10例、13例、3例，总有效率为61.54%。试验组患者的治疗效果明显比参照组患者效果好，（$P<0.05$）。

2.2 对比两组患者停药后的疾病复发率以及不良反应发生率

参照组患者的疾病复发率以及不良反应率均明显高于参照组患者，（$P<0.05$）。

表1 比两组患者的临床治疗效果[n/(%)]

组别	n	停药后复发	停药后未复发	不良反应发生率
参照组	26	8(30.77)	18(69.23)	5(19.23)
试验组	26	2(7.69)	24(92.31)	0(0.00))
χ^2	/	4.457		5.531
P	/	0.034		0.018

3 讨论

急性糜烂出血性胃炎属于一种在临床上比较常见的疾病，导致这种疾病的发病有着很多的原因，还极易造成患者发生消化道大出血的问题，将会严重的危害到患者的生命安全[2]。在临床上通常都采用硫糖铝片等常规药物用药治疗，而常规用药治疗效果不佳，无法有效的控制患者的病情[3]。而通过复方铝酸秘颗粒药物进行治疗有着更好的效果，因为这种药物中含有铝酸秘、甘草浸膏、碳酸氢钠以及弗朗鼠李皮等药物。因此，这种药物能够起到制酸以及避免患者病情恶化的诸多效果，促进患者的胃肠动力，有效的避免患者发病时便秘等不良反应。有鉴于此，我们可以清晰的认识到，复方铝酸秘颗粒药物是一种能够保护患者溃疡部位、改善患者肠道功能、避免患者出现并发症，从而降低患者痛苦的有效的治疗药物。通过开展临床研究，根据研究结果可以确认：试验组患者的治疗效果明显好于参照组患者，组间对有明显差异，（$P<0.05$）。这表明使用复方铝酸秘颗粒治疗能够取得更好的效果；参照组患者的疾病复发率以及不良反应率均明显高于试验组患者，组间对比有明显差异（$P<0.05$）。这表明使用复方铝酸秘颗粒治疗可以有效的避免患者出现不良反应，防止复发。

综上所述，对急性糜烂出血性胃炎患者采用复方铝酸秘颗粒进行治疗能够取得更好的效果，还可以有效的避免患者停药后再次发病，减少患者的不良反应，是一种值得推广的治疗手段。

参考文献

[1]陈敬松，田华，曾秋红，等．慢性胃炎及溃疡合并幽门螺杆菌感染患者采用四联药物根治性治疗后辅助铋剂模拟剂治疗的效果[J]．临床医学工程，2017，24(7):981-982.

[2]凌云志．联合应用奥美拉唑和硫糖铝治疗急性出血性胃炎的疗效分析[J]．当代医药论丛，2017,11(1):287-288.

[3]陈吉伟．枸橼酸铋钾胶囊治疗急性糜烂出血性胃炎临床观察[J]．中国乡村医药，2017，11(8):29-30.

作者简介：杨富兰，女，本科，毕业于西南医科大学，副主任医师，科室：消化内科。

（作者单位：凉山州第二人民医院）

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net